

medi del rasclament; més en ocasions no és tot lo profund que deuria i dona lloc a recidives, les quals, unides a la malignitat de l'adenoma difús propiament dit, justifiquen l'extirpació total de la matriç o hysterectomia.

§ 14. EN EL SARCOMA DE LA MUCOSA UTERINA.—Pot acceptar-se l'curetatge quan, essent inoperable d'una manera radical el neoplasma sarcomatós, s'apela a dita operació com un medi paliatiu dels symptomes (hemorrhagies, leucorrhea, dolor, etc.) que la malalta presenta; aminoració symptomatica beneficiosa temporalment pera la pacient afecta de sarcoma fòra de l'alcanç dels nostres actuals recursos operatoris.

§ 15. EN EL CANCER DEL CÒS.—Quan per medi de l'hysterectomia l'gynecolec veu que no li és possible obtindre la curació radical d'un cancer que assenti en el còs de la matriç, pot amparar-se, com procediment paliatiu, al rasclament del teixit neoplasmic, puix además de l'atenuació dels symptomes que per medi d'eixa intervenció chirurgical alcança, obté una modificació positiva, de caracter objectiu, en el trophisme general. «Aqueixa operació, practicada am les precaucions i el cuidado deguts, no té habitualment perills i dona una millora real durant alguns mesos» (1).

§ 16. EN EL CANCER CERVICAL.—Quan al cancer del coll, per haver passat els limits de l'uter (Auvard) (2), no són aplicables les grans intervencions chirurgiques (amputació del coll, hysterectomia), és a dir, la therapeutica conduent a una operació radical, o quan aquesta no és possible, allavors és aplicable el rasclament dels teixits morbosos; rasclament que, destruint aquests, palia, en lo possible, el mal que pateix la gynecopatha. Se practica així una especie de neteja de l'uter (Lutaud). No obstant, si bé ls teixits esphacelats que no fan més que favorir l'auto-toxinfecció o toxhemia cancerosa, lo propi que ls borrons o mugrons carnosos friables en els que s produeixen les hemorrhagies, deuen esser arrastrats, en cambi ls teixits que, a pesar d'estar atacats de necrobiosi i d'infiltració neoplasmica, siguin lo bastant resistents pera formar parets uterines, deuen esser respectats per la cureta, car, si no, se corre l perill d'exposar-se a la perforació, i, per lo tant, quasi a la mort de l'operada. Sabem que les hemorrhagies i la secreció fetida que trobem en el cancer de la porció cervical de l'uter,

(1) Auvard: lloc citat, pag. 502

(2) Auvard: *Guia de terapèutica*. 1892, trad. cast., pag. 666.