

devent-se amdugues a la mortificació contínua que experimenten les capes superficials del neoplasma, puix que l flux arrastra am sí fragments de teixits descompostos, i per la corrosió (*diabrosi*) obrint-se ls vasos sanguinis de la superfície congrenada. Doncs bé: per medi del rasclament dels teixits neophormats se poden suprimir aquells supramentats symptomes per un lapse de temps més o menys prolongat. Per medi, doncs, *d'una sola intervenció i d'una sola hemorrhagia* s'ha modificat essencialment l'estat de la pacienta, en el sentit de que han sigut extretes d'una sola vegada masses canceroses que, abandonades a sí mateixes, haurien necessitat llargues semmanes pera llur eliminació, provocant al mateix temps l'escampament fetid i les hemorrhagies contínues (1). *Rasclar, cauterisar am thermo-cauteri, tamponnar am la glaça iodophormica*, tals són els tres estadis de l'intervenció quirúrgica paliativa (Auvard) (2). Té tanta acció sobre l trophisme dita intervenció operatoria, que no sols la malalta, sinó també ls seus parents i conjunts, s'alucinen per les apariencies i arriben a creure en la consecució d'una curació completa, fins que l retorn dels symptomes tempòralment aliviats els fa veure l'engany de que han sigut objecte.

«El benefici, — escriu Doyen, — que s pot obtenir del rasclament en els casos de cancer uterí inoperable és ben precari i lo més sovint no s'observa després d'aqueixa operació cap retard en la marxa de l'afecció» (3). No soc tant pessimista com el cirurgià de Reims, ni tant optimista com Schröder: *in medio consistit virtus*.

Schröder opina que ha de practicar-se dita operació paliativa de manera que s'extregui la major quantitat de teixit neoplasmic. D'igual opinió participa Cervis (4), que en les vegetacions limitades o en les ulceracions circumscriptes rascla tots els teixits que constitueixen la vegetació i l *substratum* de l'ulceració fins i a tant que la part malalta és destruïda. Els teixits sans no s deixen, en efecte, arrastrar per la cureta. En el cancer d'aspecte crateriforme (de forma corrosiva), sense tumor prominent, von Grunewaldt (5) cauterisa igniament els teixits morbosos des-

(1) Schröder: lloc citat, pag. 329.

(2) *Trait. prat. de Gyn.*, pag. 502.

(3) *Technique chirurgicale*, 1897, pag. 386.

(4) *The treatment of epithelioma of the uterus by erosion* (*St. Thomas's, Pep. IX*), pag. 1, 1878.

(5) *Zur operativen Behandlung der bösartigen Neubildungen an der Vaginal-portion un der Scheide* (*Archiv. fur Gynækologie, Bd. XI, Heft 3, 1877*).