

pot alcançar la curació. Veiam, doncs, quins casos són del domini medic i quins del quirúrgic de la Gynecologia.

Si una endometritis chronica del còs de l'uteri permaneceix incurable al repòs, topics, irrigacions, medicació interna, etc., deu entaular-se l'intervenció quirúrgica per la cureta, guiant-se el gynecolec, al proposar tal operació, per la persistència de la malaltia, per la rebeldia symptomatica i per la posició social de la malalta, per l'agudeses dels dolors, i sobre tot per les hemorragies uterines. Si fluctua en el diagnostic, un cop de cureta (*rasclament explorador*) aclarirà tots els dubtes i permetrà jutjar am coneixement de causa del grau i naturalesa de les alteracions que arrelen en l'endometri.

És cert que les endometritis lleugeres, i encara les de mitjana intensitat, poden recular en sa marxa baix l'imperi del repòs i d'una medicació apropiada. Però si ls accidents morbosos persisteixen, si ls symptomes s'agraven i tendeixen a eternisar-se, crec que deu fer-se l'abradió de l'endometri, fogar de tant malestar. «L'oportunitat és senzillament una qüestió de tacte quirúrgic» (1).

Una de les millors indicacions del rasclament en la metritis chronica és la forma anomenada hemorrhagica. Arrastrant la cureta les fungositats, els petits polips disseminats per la mucosa uterina, desapareix el factor hemorrhagipar, i amb ell els microorganismes que pululen en la mucosa inflamada i profundament alterada. No és altra cosa que una escombrada en un terreny pathologic; neteja que trascendeix al restant de l'humana economia i que s fa ostensible, no tant sols per la desaparició dels symptomes subjectius de que patia la malalta, sinó també pels objectius, per lo que al physic se refereix. Pozzi diu que l millor hemostatic en la metritis hemorrhagica i el tractament curatiu és el raspatge. No tem operar en plena hemorrhagia, perquè aquesta s'estronca amb el legrat, no tant sols per obra de la destrucció de la superficie sagnanta, sinó també per la contracció reflexa que l gratatge marca en la paret muscular i en els vasos sanguinis. Lochlein (2) diu que l'abradió de les fungositats de la mucosa en la metritis interna hemorrhagica és el medi més rapid, el més segur i el més inofensiu, procedint assepticament, de suprimir

(1) Pichevin: lloc citat, pag. 424.

(2) Ueber einige Formen Endometritis corporis (Berlin, *Klin. Woch.*, pag. 372, 1886).