

A l'injectar el líquid se forma una bola, que s desfa depressa i s'ajuda a que s fongui amb una mica de malaxament. Recomanen alguns autors no injectar més de 200 a 300 grams amb una sola punxada, i si és necessari injectar-ne més quantitat se retira l'agulla i es fa l'injecció en altres punts. Crec que amb una sola punxada poden dar-se fins a 500 grams i més de líquid. Quan la cosa sigui urgent és preferible fer l'injecció intra-venosa servint-se de la vena mitjana cephalica, la mitjana basilica i també la saphena interna o l'externa.

Les solucions que s fan servir pera aquest objecte poden esser senzillament una barreja de 1,000 grams d'aigua esterilizada, que a la Clinica tenim sempre a mà, am 7 de chlorur sodic, o bé am 5 d'aquest i 10 de sulfat sodic. Amb aquestes substancies se forma el serum d'Hayem; però convé tenir en compte, com ell mateix ho recordava no fa gaire, que quan ell va fer ús del sulfat va esser pera provocar en els colerics un efecte constipant, i, per lo tant, en els altres casos no ve indicat el posar-n'hi; pero com és inofensiu, pot utilitzar-se. Hi ha, ademés, els serums concentrats, com el den Chéron, que també de vegades usem a la Clinica, si bé té l defecte d'esser molt dolorós. La temperatura d'aquestes solucions convé que sigui molt acostada a la de la sang, i encara més val una mica pujada, prop de 40°. Quan el cas sigui molt apurat, no s'ha de temer servir-sen a 40 i 42; i fins hi ha qui, com en Dawbarn, recomana les injeccions a 49°.

L'efecte d'aquestes injeccions és, en veritat, sorprenent: polsos que malgrat la cafeína i l'ether segueixen aixafats, s'aixequen depressa baix l'influencia del serum. Jo hé assistit a veritables resurreccions per aquest medi: malaltes, ja en plena agonia, han renascut a la vida. Com a contra-indicacions no n té cap, si exceptuem l'estat del cor i del ronyó. L'un i l'altre s'han de vigilar molt, en efecte; i jo recordo una malalta amb insuficiencia mitral aquí una injecció sub-cutania de 400 grams donà lloc a un resultat contra-productent; el pols fugí i sols amb ether se retornà; mes si aquests dos orguens no estan organica-ment alterats, se pot donar am confiança.

Am confiança i amb energia, i sobre tot am llestesa; perquè, si tant s'espera, l'exit minva. Per poc que la malalta perdi forces s'ha de posar en practica, pensant sempre que més val pecar per excés que per defecte. Si hi ha casos en que mig porró resucita, n'hi ha d'altres en que sols a cop de litres se fa reviuere. Una injecció de 1 a 3 litres i mig, desseguida; si convé, dugues hores després s'hi torna, i així cada dugues hores, fins que la reacció