

Naturalment que segons siga l període de l'inflamació en l'otiti que ns ocupa, els symptomes variaran, essent de menys a més la gravetat que ofereixin, segons l'afecte vagi avançant en sa destrucció.

Al principi ls malalts experimenten una sensació de plenitud en l'oïdo, un xic de sordera, i també aquells sorolls humids que s produeixen quan se tus o un se moca o s'empassa alguna cosa.

L'examen de l'aparell no dóna més datos que l'estat d'impermeabilitat de la trompa i una mica de vermellor del tympà en el trajecte del manec del martell.

Si l'inflamació no passa avant, als pocs dies torna tot al seu estat normal; però quan s'agrava comencen aquells intensos dolors sorts i insoportables en el fons de l'oïdo. Els moviments del coll i de la barra s fan difícils i augmenten el dolor. Nota l pacient uns sorolls molestos, que, junt amb els dolors i l'impaciència que l domina, el priven de descansar. An aquí ja s passa febre, i devegades ocasiona deliri, sobre tot en les criatures.

Aplicat l'especulum, se veu que l tympà presenta alteracions de forma i coloració, fa relleu exagerat cap a fòra, el triangol lluminós ha desaparegut per complet, i com al mateix temps la dita membrana s troba molt injectada, presenta un tint especial i diferent del normal i no s pot apenes distingir l'abultament del manec del martell. La sordera, en aquest cas, és quasi completa.

Quan l'otiti passa al període de supuració, el dolor i la febre s fan més intensos i el pus acumulat en la caixa i oprimit, buscant una sortida, fa forta pressió sobre l tympà, que, desgastat pel treball inflamatori, acaba pera cedir, se forada, sortint el pus a l'exterior. Allavors és quan baixen am rapidesa l'intensitat dels symptomes.

Quan és chronica l'otiti i a més revesteix la forma catarrhal, poden succeir dos casos: l'un és que hi hagi secreció abundant d'un liquid serós, que, com és natural, busca sortida, i en el cas d'estar en absolut obstruida la trompa acaba perforant el tympà i sortint a l'exterior; més en el cas oposat la membrana mucosa de la caixa està constantment hyperhemiada de tal manera que acaba engroixint-se i produint, per consegüent, diversos trastorns. Per exemple: am motiu d'aquesta tumefacció estarà impermeable la trompa; els voltants de les finestres oval i rodona, lo mateix que del tympà, estaran engroixits, i, per tant, els moviments respectius d'aquests orguens no seran prou lliures i la trans-