

en aquest cas la freqüència de l'otiti no ha sigut més que de 8'3 per 100. La solució que s'emplei deu esser al 10 per 100, perquè ofereix les mateixes garanties com a medi prophylactic de l'otiti que la del 20 per 100, i aquesta, en cambi, és susceptible d'ocasionar l'oligúria, am coloració verda o negra dels orins, deguda a l'eliminació de la resorcina per la via renal.

Per consegüent, la solució de resorcina al 10 per 100 pera ls tocs de la gola és el medi més acceptable pera evitar la producció d'una otiti.

Durant el periode agut de l'otiti mitja és precís veure de calmar el dolor. Pera això són d'utilitat els fonents calmants i antiseptics aplicats a la regió temporal i mastoidea, les sangoneres i les injeccions de morphina. També són utils les instilacions calmants i les fumigacions. Se donaran els revulsius del tubo digestiu, especialment los preparats salins, i se repetiran varies vegades.

Així que s comprovi la presencia d'una collecció liquida en la caixa és necessari donar-li, sortida, practicant una punció, que, segons recomana en Duplay, deu fer-se en el punt més prominent de la membrana tympanica.

Després d'això, o bé en el cas d'haver-se obert pas el liquid per sí mateix, se procurarà disminuir i evitar del tot l'exudació per l'ús de les injeccions d'acid boric al 4 per 100 o de chloral al 1/20.

En l'otiti mitja chronica deu instituir-se un tractament general segons la constitució del malalt. L'aigua freda, sigui en forma de banys de mar o qualsevol dels altres usos hydrotherapics, deu esser privada. En cambi, la medicació thermal dóna bons resultats. Es de rigor el tractament de les lesions de la pharynge, per causa de les intimes relacions que tenen am les afecions de la caixa; de manera que en aquest sentit estan molt indicades les fumigacions, les pulverisacions i les irrigacions nasals. L'ablació de les amígdales i la secció de la campaneta s fan precises en alguns casos. Ajuda al tractament d'aquesta otiti l'aplicació de revulsius en l'apophysi mastoide, tals com les manxules, la tintura de iode i les puntes de foc.

Pera obrar eficaçment sobre la mucosa de la caixa sols disposem d'un camí, que és la trompa de Eustachi. Les injeccions d'aire, fetes directament en la caixa per medi de la sonda d'Itard, poden retornar en part a la membrana i a la cadena dels ossets la seva anterior flexibilitat. Si la trompa s conserva permeable,