

VULVA I VAGINA

D. O. OTT.—Ausència congenita de vagina.—Vagina artificial.—
(*Soc. d'Obst. et de Gyn. de Sant Petersburg, 1898.*)

Malalta que als 28 anys d'edat entrà a l'hospital per impossibilitat de cohabitar. Per l'examen se troba la falta de vagina. Els orguens genitals externs ben desenrotllats; vestigis d'himen, sèns orifici anterior vaginal, que és reemplaçat per un envà membranós, replegat de manera que ve a formar un *raphe* sortint antero-posterior. Pel tacte rectal va trobar-se una massa dura que si bé recordava l'uter, venia a esser una vegada i mitja o dugues més voluminos que aquell orgue en estat normal de vacuïtat.

La malalta jamai havia menstruât, havent sentit sols desde que complí ls 24 anys uns forts colics uterins cada tres semmanes.

Diagnostic: ausència congenita de vagina, uter ben desenrotllat. hematometra, ovaris normals.

Tractament: formació d'una vagina artificial conservant l'uter i els ovaris.

KLEINWACHTER.—Prolapse de la bufeta en la dona.—(*Zeitschrift für Geburtsg. und. Gyn. XXXIV, 2.*)

El tractament consisteix en fer la reposició, valent-se o no de l'anestesia, procurant mantenir després en son lloc l'orgue reduït; podent-se lograr això ultim valent-se d'un tamponament vaginal i exercint aixís una pressió sobre l coll de la bufeta, aconsellant-se al mateix temps el repòs en el llit, la proscripció de tot esforç i, a esser menester, l'evacuació de la bufeta per la sonda, sobre tot tractant-se d'adultes an els qui més tard podran esser-los reemplaçats els tampons per un pesari. En el cas desgraciât que aquest tractament no fes el seu efecte, queda encara com a ultim recurs la *ventrofixació* de la bufeta. De totes maneres, aquesta operació serà molt poques vegades necessaria, puix de 15 casos en els quals s'ha seguit el tractament abans mentat, en 11 hi ha hagut curació sense operacions, morint els altres 4 malalts, i sols dos d'aquests per l'uremia deguda al prolapsus.

KOPYTOWSKI.—Els gonococcus en les secrecions purulentes dels orguens genitals de les meretrius.—(*Kronika lekarska, 1898, 6.*)

L'autor ha examinat la secreció purulenta de més de 300 malaltes al donar-los l'entrada per l'hospital, trobant que en un 60 por 100 d'aquests casos els gonococcus viuen en el pus de l'uretra, en un 28 por 100 els descobrí en el pus de la glandula de Bartholin, i en un 9 per 100 pululaven per les secrecions del coll uteri. Examinades les secrecions del coll uteri en les mateixes malaltes desseguida que acabava la regla, en Kopytowski hi va trobar gonococcus en 10 per 100 dels casos objectes d'estudi i experimentació, fet que pot-ser confirma l'opinió vulgar generalment admesa que creu a la blenorragia sobre tot contagiosa quan té lloc o mentres dura o immediatament després del període menstrual. L'autor nò ha pas trobat ni una sola vegada l microbi de la purgació en les secrecions vaginals, aon tant diferents classes de micro-organismes hi pululen en abundancia.

En Kopytowski ha sotmès les malaltes a la sortida de l'hospital a