

UTER I ANNEXES

J.-N. GRAMMATICATI.—**Modificacions dels ovaris baix l'influència de les injeccions intra-uterines d'alumnol.**—(*Vratch*, n.º 25, i *Rev. de Gynéc.*, n.º 5, 1898.)

L'autor, a conseqüència de múltiples observacions clíniques, ha arribat a la convicció de que les injeccions intra-uterines d'alumnol determinen la disminució primer, la desaparició després, de la menstruació i, per lo tant, de l'ovulació. En apoio d'això aporta una observació completa amb examen histologic.

Se tractava d'una dona que presentava un tumor abdominal gros com un cap de fetu, passant del pubis cinc travessos de dit. La massa dura predominava a dreta i en el cul-de-sac vaginal dret, essent l'uter empès cap a l'esquerra.

Se feren 115 injeccions intra-uterines amb una barreja de tintura de iode, d'alumnol i d'alcool. La menstruació tingué lloc solament el primer més després de l'aplicació del tractament i després va cessar del tot. Però com el tumor dret no regreixia sensiblement, l'autor va fer la laparotomia. Era un quiste dermoide de l'ovari dret, amb un petit ovari esclero-quistic a l'esquerra. L'examen histologic d'aquest ovari esquerre va demostrar una anèmia vascular intensa, pocs foliculs primordials i cap de madur, i cap còs groc; en suma, ausència de signes de la funció ovarica. L'autor sosté que fou baix l'influència de les injeccions intra-uterines d'alumnol que aquesta modificació ovarica tingué lloc.

VIES URINARIES

C. A. SJUNGGREN.—**Un cas de bufeta doble am retenció d'orina.**—(*Nordisk Medicinisk Arkiv* i *Rev. de Gynéc.*, Setembre-Octubre, 1898.)

L'autor comunica l'observació següent d'anomalia rara. Un noi de dotze anys va sentir de repent, i sense cap raó, vius dolors en la regió hypogastrica; apareixien baix forma de colics, a intervals irregulars. La micció era normal. Durant una d'aquestes crisis doloroses se pogué observar, a la regió hypogastrica, un tumor elàstic del volum d'un cap de criatura. Se va introduir una sonda a la bufeta, però l tumor no va desapareixer pas. Se practicà allavors la laparotomia i se va trobar un tumor elàstic que ocupava l mig de la petita pelvis i pujava fins al llombrigo. S'introduí en aquest moment una sonda a la bufeta i s'hi injectà aigua borica: aquesta injecció no tingué cap efecte sobre l tumor. Aleshores aquest va ésser incís i se n'escapà una ona d'orins. La paret del tumor se composava de les tres capes serosa, muscular i mucosa. Se desenrotllà una fistula que feia comunicar la cavitat del tumor am l'exterior, i el malalt va orinar tant per la fistula com per l'uretra. Una injecció de líquid colorant donada per la fistula no penetrà mai a la bufeta normal.

Més tard s'obrí una comunicació entre les dues bufetes. En el curs d'aquesta segona operació s va comprovar que ls dos orguens eren completament independents. La bufeta anormal rebia l'ureter esquerre i enviava un prolongament cap a sota de la bufeta normal, sense obrir-se a l'uretra. El malalt fou guarit després de la segona intervenció.

L'autor no creu pas que s tractés d'un diverticul de la bufeta, car