

el tumor no comunicava amb aquest orgue i a més un dels ureters hi feia cap. Tampoc era una bossa formada per la dilatació d'un ureter, puix aquest últim era normal i no hi havia hydronephrosi.

Cal, doncs, admetre que era un cas de bufeta doble amb una part anterior i una altra posterior.

Aquesta anomalia és rara: Péan sol n'ha descrit un cas semblant a la *Gazette des hôpitaux* de 1898, n.º 63. L'anomalia pot ésser deguda als vestigis dels canals de Müller.

VARIA

P. SHOBER.—Paresia intestinal consecutiva a les operacions abdominals.—(*Am. Journ. of Obst.*, 1898.)

De totes les complicacions que poden sobrevindre consecutivament a les operacions abdominals, una de les més molestes pel cirurgià és la paràlisi del budell, quals symptoms comencen generalment a l'acabar-se l primer dia o en el transcurs del segon, resultant en ocasions molt difícil l'establir el diagnostic diferencial entre ella i l'infecció.

La conducta a que s deu subjectar el cirurgià és plenament diferent en els dos casos, el diagnostic molt incert, i la paràlisi dels budells, una vegada establerta, tant difícil de vencer, fa que lo millor sigui dirigir tots els nostres esforços a previndre aquest accident, posant en pràctica ls medis que aconsella l'autor:

Sostindre l cor i alimentar bé a la malalta per la via rectal quan hi hagi mareig i vomits, donant una lavativa nutritiva cada quatre hores.

Pera que l cor no decaigui, donguin-se injeccions hypodermiques am 2 miligrams i mig d'strychnina cada tres o quatre hores, substancia medicamentosa que ademés compleix l'indicació d'actuar favorablement sobre ls moviments peristaltics dels budells, acció que s podrà afavorir propinant a la malalta cada hora de 2 a 5 centigrams de calomel i donant cada quatre hores una lavativa, am tota la força possible, amb una solució de sulfat de magnesia, glycerina i trementina, deixant, si convé, el tubo rectal a fi de permetre am tota llibertat la sortida dels gasos. Les lavatives o les injeccions sub-dermiques am conyac poden ésser aquí d'una utilitat gran.

Quan els budells comencen a funcionar, els sofriments per part de la malalta poden augmentar, constituint aquest agravament subjectiu, quan sobrevé, un bon signe, puix tot calma am les primeres evaquacions. Si l pols segueix debil desde que aquestes se presenten, torni-s a fer ús dels estimulants.

La set de les operades se calma avantatjosament am grans injeccions rectals d'una solució salada normal, la que obra per altra part aixecant les forces i augmentant la freqüència del pols.

Una vegada establerta la funció intestinal, ja no s'ha generalment de tenir por de que sobrevinga per aquest costat cap més complicació fins a la curació plena de l'operada.

SACHS.—De la glandula thyroide en les afeccions gynecologiques.—(*Kronika Cekarska.*)

L'autor emplea la glandula thyroide en forma de pastilles, contennint cada una 30 cent. Se comença per administrar una sola pastilla al dia, arribant a la dosi de quatre al cap d'alguns dies. Jamai ha observat