

Vi de Chassaing

Bi-digestiu

A la pepsina i a la diastasa



pepsies particularment. Se l pren a la dosi d'una o dues copetes de licor després de cada menjada, pur o amb aigua.

Cada copeta de licor conté: 0'20 grams de *Pepsina Chassaing*;
: : : : : : : : 0'10 grams de *Diastasa Chassaing* : : : : : : :

Aquesta preparació, que en 1864 ha sigut l'objecte de un informe favorable a l'Academia de Medecina de Paris, se prescriu desde nombrosos anys contra les diferentsafeccions de les vies digestives, les dys-

Fosfoglycerat de Calç pur

Neurosina Prunier

RECONSTITUENT GENERAL DEL SYSTEMA NERVIOS

La **Neurosina Prunier**, presentada baix tres formes diferents, se pren en general a les dosis següents, abans o durant la menjada:

- 1.^a **Neurosina Prunier-aixarop**, 2 o 3 cullerades grans per dia.
- 2.^a **Neurosina Prunier-granulada**, 2 o 3 culleradetes per dia.
- 3.^a **Neurosina Prunier-osties**, 2 o 3 osties per dia.

Cada culleradeta gran d'aixarop, cada culleradeta de granulat, cada ostia, contenen 0'30 gr. de fosfoglycerat de cal pur.

Diposit general: 6, Avenue Victoria, PARIS

FOSFATINA FALIÈRES

La **Fosfatina Falières** és l'aliment més agradable, el més recomenat pera les criatures desde l'edat de 6 a 7 mesos, sobre tot en el moment de desmamar-los i durant el periode de creixença. Facilita : : : la dentició, assegura la bona formació dels òssos, etc. : : :