

en particular i diarrhea dels nens) usant l'antiseptic en solució debil, tant debil que en alguns casos ens valem solament de l'infusió feta am la planta mare, donada, no per la boca, sinó en forma de lavatge rectal ample i sostingut (2 o 3 litres del infús o solució debil cada vegada); tractament que algun efecte deu tenir quan de ja tant temps era del domini public i vulgar, que tantes coses aporta a la ciencia. Séns dubte podrà objectar-sens que en aquest cas el lavatge actua més mecaniment, o siga per arrastre, que no per veritable acció physio-therapeutica: no ho negarem; però tampoc cal en absolut donar-hi aquella interpretació, puix se comprèn que, per petita que siga la quantitat de medicament actiu injectada, sempre en quedará alguna minima porció contactant directament am la tunica mucosa del tram intestinal, exercint *in situ* els dos efectes: antiseptic l'un, per mecanisme indirecte; de vaso-constricció l'altre, encara que lleugera, però molt apreciable en la febre typhoidea donat l'estat d'exulceració o ulceració típica en que s troba la mucosa.

(Seguirà)

LA FLORA THERAPEUTICA DE CATALUNYA

RANUNCULACIES JUSS.

(Continuació)

NIGELLA L.

Genre de plantes herbacies, anyals i llises, de fulles alternes profundament dividides en segments estrets, pinnatisques, flors terminals i solitaries, nues o involucrades, i llevors negres i aromatiques.

ARANYES.—*N. damoscæna* L.—Fr., *Nigelle de Dames, Patte d'araignée, Cheveux de Venus.*—A Montjuic, *Salv. Colm.*, per quasi tot el litoral i també cap a Berga, *Csta.*, etc.—Abril, Juny.—A l'Orient se té aquesta planta en gran estima, i l'usen com condiment i com aphrodisiac i tonic. Segons en Mérat i en de Lens, les llevors passen per fortificants, carminatives, cephaliques, emmenagogues, diuretiques, etc., i se donen en infusió vinosa.