

En relació a la naturalesa i topografia dels estigmes trobats els dividirem per regions, per a millor condicionar el seu estudi, i seguint un ordre natural, comencarem pel crani.

En aquest hem trobat en 40 casos una plàgio-cefàlia o asimetria cranial més o menys accentuada, anterior o posterior (40 %). Lombroso dóna un 61 % de cranis asimètrics en delinqüents, i Corre, del 60 al 70'3 % en diferents tipus de criminals. Aquesta conformació és deguda a una desigualtat de les semi-corbes laterals, tant en el quadrant anterior del contorn, com en el quadrant posterior. Les nostres xifres són baixes en relació a les dels autors esmentats, però la diferència és comprensible, entre altres raons, per la diferència dels subjectes sotmesos a observació.

De les altres anomalies cranials hem trobat:

Hidrocefàlia	2 casos
Microcefàlia	1 »
Aerocefàlia	2 »
Escafocefàlia	3 »
Platicefàlia	2 »
Trococefàlia	4 »
Cli-nocefàlia	19 »
Id. lleugera	11 »

Precisa fer algun comentari respecte d'aquestes observacions.

En primer lloc, l'exigüitat de casos de microcefàlia registrats (1 %), quan Lombroso creu que molts delinqüents són, sinó microcèfals, sub-microcèfals en la seva major part (les nostres observacions, a part l'examen directe, vénen confirmades per les mides obtingudes). En segon lloc, ens ha sorprès l'abundós nombre de casos de cli-nocefàlia, que sumen globalment 30, essent molt manifesta en 19. Aquesta anomalia està constituïda per una notable depressió de la regió bregmàtica que dóna al crani l'aparença d'una sella. Com sigui que Lombroso li assenyala una proporció d'un 4 %, hem aprofundit les nostres observacions i hem trobat marcat aquest caràcter, principalment, en menors procedents de les regions levantines, i en quant a la naturalesa del fet delictiu, es descomposen així: