

Diastema (dents separades)	2	»
Nistagmus	2	»

Del tronc, hem deixat d'anotar la forma del tòrax, tan ben estudiada pels primers antropòlegs, perquè, a judici nostre, s'ha demostrat d'una manera suficient que si bé inicialment en la forma del mateix hi ha una marcada influència hereditària, les perturbacions nutritives dels primers mesos de la vida hi influeixen decisivament.

Presentaven cifosis lleugera	2	casos
» hèrnia inguinal lateral (de debilitat)	3	»
» fimosis	16	»
» criptorquídia lateral ...	1	»

De les extremitats cal notar l'abundosa proporció de menors que presenten mancinisme (esquerrans) per predomini del costat esquerre, que són en nombre de 20. D'aquests, el dinamòmetre de Sternburg acusava l'anomalia (que comprovàvem després), resultant que alguns d'ells han arribat a utilitzar la mà dreta per determinades funcions, com menjar, escriure, etc.; però quan han d'actuar en funció de força, empren la mà esquerra per pegar o jugar també, com ha confessat algun. Altres, en canvi (la majoria), no han pogut vencer aquesta tendència i en fan un ús ininterromput. En 7 casos hi havia ambidextrisme.

Resulta, doncs, que adoleixen d'un mancinisme més o menys acusat, un 20 %, i d'ambidextrisme, un 7'60 %.

Altra de les dades que revelen un caràcter reversiu és la braca. En general, els antropòlegs confirmen aquest caràcter, i així, Lacassagne, que verifica aquesta mesura en un regiment disciplinari compost de 800 places, trobà que eren:

Inferior a la talla	91	vegades
Igual a la talla	86	»
Superior a la talla	623	»

En canvi, Marro dona uns promigs sensiblement iguals en els normals i els delinqüents. Amb tot, és un fet que aquest caràcter que acostia l'home als antropoides, molts criminals l'han presentat. En les nostres recerques hem trobat: