

Si regirem la casuística de malformacions genitals, veurem que els casos senzills d'epi o hipospàdies són en petita proporció al costat dels veritables estats intersexuals que, desconeguts en tota la seva extensió fins fa poc temps, tenen una justificació ontogènica si partim de la concepció actual d'aquests problemes, com ha explicat molt bé Marañón en dir que «el femeni i el masculí no són dues valors terminantment oposades, sinó graus successius del desenrotllament d'una funció única, la sexualitat, que entre la infantesa i la vellesa—en les que està apagada—s'encèn durant el període central de la vida, amb diferències *purament quantitatives* i cronològiques d'un sexe a l'altre».

D'aquí que les classificacions adoptades, particularment la de Klebs, són seductores, perb inacceptables en la pràctica, perquè parteixen d'un principi teòric, com veiem, avui rectificat i en conseqüència, resulten artificioses, ja que el veritable sexe ve condicionat d'una manera decisiva per les glàndules sexuals ordinàriament diferenciades (testes u ovaris), i la resta de caràcters, àdhuc els externs, tenen una importància molt relativa (3). Els termes emprats de la classificació de Pozzi, que utilitzem en el nostre cas per a adjectivar-lo, malgrat ésser força raonables han merescut un comentari desfavorable, més no ha trobat un terme millor d'expressió.

(3) L'aparència externa de les esmentades glàndules no és tampoc d'un valor definitiu, entre altres raons, perquè sols histològicament pot afirmar-se, en la major part de casos, per l'evidenciació de l'epiteli germinal específic de cada sexe. Aquest examen ha de fer-se de la totalitat de les glàndules, doncs s'ha trobat algun cas en que la morfologia i les inclinacions revelaven un estat intersexual que no corresponia amb les primeres troballes histològiques, i que orientant millor les recerques s'ha trobat que en la mateixa glàndula un pol corresponia a epiteli germinal i l'altre a epiteli fol·licular. o sigui que dintre la mateixa glàndula coexistien els dos sexes, el que explicaria l'ambivalència i les oscil·lacions de la libido entre un sexe i altre segons el predomini que en determinat moment prenía l'un damunt l'altre. De vegades, com en un cas de Recassens, resulten les esmentades glàndules, histològicament, indistinguibles.

Camiseria, Corbateria i Articles de Punt
ESPECIALITAT EN CAMISES A MIDA

JAUME SANS

Boqueria, 32 - Telèfon 16036 BARCELONA