

Aquesta apreciació potser no respon exactament a la realitat, doncs això no és precisament el que s'observa en l'evolució femenina a través de les etapes sexuals en què, passat el període d'indecisió, ve la intensa feminitat per virilitzar-se en el climateri (desaparició de la menstruació), desenrotllant-se el pèl (hirsutisme), canviant el caràcter i accentuant-se l'intervencionisme social, canviant de vegades els costums i fins algun cop l'orientació de la libido. L'explicació és la manca d'increcions específiques de l'ovari que actuarien normalment en sentit d'inhibició i en desaparèixer actuarien les increcions glandulars antagoniques. En determinats casos d'hermafrodites, com en els de Carles-Caterina Hohman i Schanerte, passa precisament el contrari, cosa que creiem ocorrerà en el cas nostre amb persistència duradera dels caràcters virils. Tingui's en compte que en el darrer cas l'evolució es realitzà després de l'extirpació d'una glàndula bi-sexual (ovari-teste), pel que, aleshores predominà el caràcter marcadament femení que constituïa l'estructura morfològica del seu organisme.

Cal, doncs, en vista d'aquestes dificultats, disposar d'un mitjà educatiu que no produeixi efectes pertorbadors damunt el desenrotllament del seu veritable caràcter.

Abandonada tota idea d'intervenció quirúrgica, almenys abans que es presenti una indicació concreta (12) de millorament de les seves condicions, tasca confiada al temps, es presenta al nostre esperit la possibilitat d'una intervenció terapèutica de base operàtica (tractament per mitjà de preparats glandulars). Aquesta podria estar formulada a base de preparats còrtico-suprarrenals, tiroides i testiculars, que, almenys teòricament, sincronitzen elj funcionalisme masculí, ja que aquesta influència és més manifesta en el període de creixement que quan existeix una libido estabilitzada damunt la qual està comprovada la seva absoluta ineficàcia (13). Complementàriament pot actuar, com a coadju-

(12) Aquesta indicació pot venir determinada, per exemple, pel fet d'una compressió glandular, la qual comprometria el teixit germinal degenerant-lo en benefici del teixit intersticial, indiferent des del punt de mira hormonal.

(13) S'ha apuntat la conveniència d'intervenir reforçant la sexualitat masculina per mitjà de la tècnica dels inerts pels procediments de Stefnach i Voronoff. Vegi's el treball del professor Cardenal, per a més detalls.)