

4.^t Que tot i pretendre, segons les possibilitats, llur execució i assegurant també la destrucció dels mosquits i la protecció mecànica dels individus contra els seus malifets; és necessari, en el que es refereix a l'infant, usar mètodes de quininització preventivo-curativa dels quals se n'hagin fet proves.

5.^e Que la noció del paludisme congenital imposa l'empleu de la quininització en la dona en estat interessant i que és necessari facilitar en les consultes pre-natals ben organitzades l'empleu sistemàtic de la quinina en la futura mare.

6.^e Que la quininització ha d'ésser aplicada a tots els infants en període de lactància i nois en medi palustre, els quals han d'ésser vigilats i servits sistemàticament gràcies a una organització apropiada, assegurant la distribució de les preparacions de quinina i la regularitat del seu empleu.

7.^e Que aquestes mesures, arreu on sigui possible, han d'ésser facilitades per una educació i una higiene escolar antimalàrica, fent comprendre per endavant als educadors, als infants després, la importància i les regles de l'execució de les mesures antimalàries. Aquesta educació i aquesta higiene comporten així mateix totes les mesures tenint en compte l'escola i l'habitació, l'alimentació, els vestits, l'organització del treball intel·lectual realitzat als diversos països, especialment a Itàlia on s'ha fet la prova de llur eficàcia.

8.^e Que la necessitat d'una quininització regular justifica ben aviat els esforços actualment en curs per atendre la producció de la quinina i els que persegueixen obtenir la seva desvalorització, fent més fàcil la generalització del seu empleu.

Qüestió II.—La profilàxia del raquitisme i de l'espasmofília.

(Ponents: Prof. Monrad, Copenhague, i Rominger, Kiel.)

LAXO-VIAN PURGANT I DEPURATIU

Es el millor laxant; amb el seu ús es logra corregir l'estrenyiment

Farmàcia i Laboratori Dr. ROIG PERELLÓ · San Pau, 33 · Barcelona
