

los niños, requieren un medicamento eficaz, pero, al mismo tiempo, un medicamento que no resulte perjudicial para sus tiernos y delicados organismos. El BOROSAL cumple a maravilla esta doble condición.

Los niños indóviles, irritables, violentos de carácter, se tornan suaves y apacibles con la medicación sedante del BOROSAL. Las tendencias eróticas de los adolescentes, tan perjudiciales para su salud y desarrollo, se corrigen positivamente con nuestro preparado. Ya hemos relacionado antes las curaciones sorprendentes que se obtenían con el BOROSAL en los casos de incontinencia nocturna de los niños y adolescentes.

El BOROSAL en las Neurosis y Psicosis

Las neurosis como el *histerismo*, *corea*, *tics*, *psicastenia* y las enfermedades mentales en general, que presentan como síntoma dominante de la enfermedad, un estado de eretismo o excitación nerviosa, serán beneficiosamente influenciadas y corregidas con el BOROSAL.

A propósito, entre las neurosis no colocamos la *neurastenia*, pues queremos hacer hincapié especial en ella por tratarse de un síndrome de tal complejidad. La irritabilidad nerviosa y un exceso de excitabilidad, tanto de la esfera sensorial como de la psíquica, son, dentro de sus variadísimas manifestaciones, los síntomas fundamentales y predominantes de la neurastenia. De aquí que apenas hallaremos un caso de esta enfermedad, en que no esté perfectamente indicado el BOROSAL. El neurasténico obtendrá, con nuestro preparado, resultados tan satisfactorios que difícilmente logrará con otras medicaciones.

Dosis y manera de usar el BOROSAL

En la *epilepsia*, se empezará la medicación tomando una cucharada de café de BOROSAL después de almorzar y otra después de comer, mezclada con un poco de agua azucarada, siguiendo con esta dosis durante quince días seguidos. Durante la segunda quincena se tomará cucharada y media después de almorzar y una después de cenar. En la tercera quincena, cucharada y media después de almorzar y cucharada y media después de cenar. Así sucesivamente se irá aumentando la dosis en media cucharada cada quincena, hasta llegar a la dosis máxima de dos cucharadas pequeñas después de almorzar y dos después de cenar. Cuando se alcance la desaparición de los ataques o el reducirlos a sencillos y espaciados vértigos, se sostendrá la dosis con que se haya logrado, sin aumentarla.

Desaparecidos los ataques, debe continuarse la medicación durante medio año, y durante un año en los casos más graves, descansando solamente diez o doce días cada dos meses.

En los casos que no se obtenga suficiente éxito con las dosis indicadas, pueden éstas aumentarse hasta llegar a doblarlas, pero en estos casos será prudente consultar al médico o al autor de este específico, en cuyo caso, gratuitamente, se le harán las indicaciones oportunas.

En la *corea*, *histerismo*, *neurastenia* y demás formas crónicas de excitación, se procederá en igual forma que en la epilepsia, con la sola diferencia que en la corea y el histerismo la medicación, después de la cura, se continuará solamente durante unos dos meses, y en la neurastenia y demás formas de excitación durante un mes y disminuyendo lentamente las dosis del medicamento.

En la *incontinencia nocturna de orina* se empezará la medicación como hemos indicado en la epilepsia, pero las dosis se aumentarán cada ocho días, en vez de cada quince; y se seguirá la medicación después de curado, durante un mes, con la misma dosis que se haya obtenido el éxito, y durante otro mes, rebajando lentamente las cantidades del medicamento.

Los niños de 5 a 6 años tomarán solamente una tercera parte de las dosis señaladas, y los niños de 6 a 8 años, la mitad de dichas dosis; de 8 a los 12 años, tres cuartas partes de las indicadas dosis. Los mayores de 12 años pueden tomar las mismas dosis que los adultos.

Fórmula de composición: Solución acuosa de Tartrato bórico sódico al 50 %.

Una cucharadita de café contiene 2'50 grs. de Tartrato bórico sódico.

DEPÓSITO GENERAL:

FARMACIA GELART, Princesa, 7. - BARCELONA

Preparado en los Laboratorios Sókatarg, Fomento, 15. — BARCELONA