

BOROSAL

Sol. acuesa de tartrat bórico sódic al 50%

EPILEPSIA

INCONTINENCIA NOCTURNA D'ORINA DELS NENS Y ADOLESCENTS

Medicació introduïda recentment a la pràctica per els doctors Marie, Crouzson i Bouttler

(Comunicació a la Acadèmia de Medicina de París, Juny de 1920).

El BOROSAL substitueix amb gran ventatja la medicació bromurada. Efectes molt superiors; cap dels seus inconvenients (ni trastorns gàstrics, ni accés medicamentosos), ni entorpiment cerebral.

El BOROSAL no es una medicació palliativa. EL BOROSAL modificant el metabolisme nutritiu de les cèlules nervioses, obra sobre la causa i arriba a curar radicalment la EPILEPSIA



INDICADÍSSIM

en la

NEURASTÈNIA

HISTERISME

MIGRANYA

COREA

ESPASMES

INSOMNI

DELIRIS

i en general en tots els cassos de

ERETISME NERVIÓS

El BOROSAL es el primer i únic específic similar en Espanya

Preparació i presentació esmeradíssima

DOSIS: 1 a 3 cullerades de café, dugues vegades al dia després de menjar, amb aigua ensucrada o xarop.

ELS ATACS EPILÈPTICS desde les primeres setmanes d'èsser medicats amb el Borosal, disminueixin progressivament en número i intensitat en forma realment meravellosa. Cal només persistir per a obtenir la desaparició completa dels esmentats atacs.

LA INCONTINÈNCIA NOCTURNA D'ORINA desapareix sense que calgui d'insistir gaire amb la medicació.

Aquest medicament es inofensiu i sempre ben tolerat adhuc pels nens