

Productes Farmacèutics Especialitzats

# Maurice Leprince

Doctor en Medicina. Farmacèutic de primera classe.  
Lloregat de la Facultat de Medicina, de la Escola  
Superior de Farmàcia i dels Hospitals de París.

Paris — 62, Rue de la Tour, 62 — Paris

## Memento terapèutic

PRODUCTES	INDICACIONS	MANERA D'EMPLEU
<b>Cascarine LEPRINCE</b> (C <sup>13</sup> H <sup>10</sup> O <sup>5</sup> )	<i>Estrenyiment habitual. Afeccions del fetge.</i> Estrenyiment de la gravidesa lactància, etc., etc. Colagog i després copragog de primer ordre.	PINDOLES DOSIFICADES a 0.10: Una o dues pindoles a l'anar al llit o en els àpats si l'estrenyiment és d'origen digestiu.
<b>Guipsine</b> Principis útils del vesic	Medicació hipotensiva, <i>Hipertensió</i> deguda prin- cipalment a la fatiga del cor. Específic de <i>dismenorreas</i> i de les <i>hemoptisis</i> .	PINDOLES <i>dosificades</i> a 0.05: De sis a deu diàries <i>entre els àpats</i> AMPOLLES <i>dosi-</i> <i>ficades</i> a 0.05: De una a dues injeccions in- tramusculars al dia (en els casos urgents).
<b>Eumictine</b>	Blenorràgia, Uretritis, Cistitis, etc. <i>Antigono-</i> <i>còdic, diurètic etc. (Tractament complet).</i>	CAPSULES embolicades amb gluten, conte- nin cada una 0.20 de Santalol, 0.05 de Salol i 0.05 de Hexamitileno-Tetramina (Sin: <i>Urotropina</i> ): de vuit a dotze en els àpats.
<b>PÍNDOLES del Dr. Sejournet</b>	A base de SANTONINA. Tractament de la <i>diabetis</i> sense règimen especial.	PINDOLES <i>dosificades</i> a 0.025; Una píndola en cada àpat.
<b>Rhomnol</b> (C <sup>40</sup> H <sup>54</sup> Ax <sup>14</sup> P <sup>4</sup> O <sup>27</sup> ) A base d'acid nucleïníc pur i dels principis nu- cleo-fosforats dels cereals	Poderós reconstituent del nòdul celular. Ver- dadera nucleoteràpia. Hiperleucocitari de primer ordre. Especialment indicat per a les convalescències, etc.	PINDOLES <i>dosificades</i> a 0.05: De una a dues pindoles al dia en els àpats. SACARUR (GRANULAT) 0.10 <i>per cullerades de</i> <i>café.</i> Una culleradeta en els àpats per els grans i la meitat o quarta part per els nens. —AMPOLLES de 1, 5, i 10 c. c. ( <i>dosifica-</i> <i>des</i> a 0.05 de nucleinat de sosa <i>per centi-</i> <i>metre cúbic</i> ) per injeccions hipodèrmiques. (Especialment indicades en les infeccions agudes).
<b>Neo-Rhomnol</b> Nucleinat d'estrícina i cacodilat de sosa. Cos non	Sobirà reconstituent en totes les decadències, astèniques, neurastèniques i convalescències, mitjantsant l'associació de: <i>Fòsfor, Etric-</i> <i>nina, i Arsènic,</i> completament assimilable.	AMPOLLES de un c. c. Cada una conté un miligram de nucleinat d'estrícina definit i 0.05 gr. de cacodilat de sosa. Durant dotze dies una injecció diària; reposar dotze dies més i tornar començar de nou. Injeccions agudes).
<b>Arsycodile</b> Cacodilat de sosa pur	Accelerador de la nutrició general; produeix gana, etc. Especialment indicat per a l'ús subcutani.	AMPOLLES <i>dosificades</i> a 0.05: Una injecció diària durant vuit dies, repòs una setmana i tornar començar, fins a lograr la curació.
<b>Neo-Arsycodile</b> Metilarsinat disòdic (Sin.: Arrhenal)	IGUALS INDICACIONS	PINDOLES <i>dosificades</i> a 0.01: De quatre a cinc diàries en els àpats durant dotze dies; repòs d'una setmana i tornar al tractament. AMPOLLES <i>dosificades</i> a 0.05: El mateix ús que per l'Arsicodil i especialment en c. pa- ludisme crònic.
<b>Ferrocodile</b> (Cacodilat ferrós)	<i>Específic de la Clorosi, de la Malaria, de l'</i> <i>Anèmia palídica, etc. Tots els aventatges</i> <i>de les SALS FERRUGINOSAS i de l'AR-</i> <i>SENIC ORGANIC.</i>	PINDOLES <i>dosificades</i> a 0.025: Quatre per dia, en els àpats.
<b>Ferricodile</b> (Cacodilat fèrric)	Única SAL DE FERRO que obra molt bé en injeccions hipodèrmiques. COMPLETA- MENT INDOLOROS.	AMPOLLES <i>dosificades</i> a 0.05: El mateix ús que'l Arsicodil, <i>Anèmia, Clorosi, Malaria,</i> <i>etc., etc.</i>

Nota.—Preguem als metges que demanin mostres d'aquests productes, que seran remeses gratis per l'AGENT

**A. Ambroa**

Apartat 205 - BARCELONA