

*Art. 30.*—El metge que és cridat per visitar un malalt d'un dels seus confreres per un cas d'urgència, ha d'emprar les atencions immediatament necessàries, informar el metge de capçalera del tractament instituit, així com de la urgència, i cessar les visites.

Cridat en absència del de capçalera, el metge ha de finir les seves visites en retornar el company i posar-lo al corrent del tractament fet. No pot reveure aquest malalt en el curs de la mateixa malaltia més que en consulta amb el dit confrere, o sota demanda formal de la família, després d'haver ell mateix avisat a aquest i haver-se conformat a les altres prescripcions de l'article 29.

És prohibida tota visita clandestina al malalt d'un company.

*Art. 31.*—És prohibit tot oferiment de serveis per suplantar un confrere.

*Art. 32.*—Quan la família o el metge de capçalera demanin una consulta, aquest pot indicar el consultant que prefereix, però ha de deixar en la més ampla llibertat a la família i acceptar el que ella desitgi, si l'honestedat i la vàlua del proposat estan per damunt de tota sospita; el metge ha d'inspirar-se ans de tot en l'interès del malalt.

El metge de capçalera és lliure de retirar-se, si hom vol imposar-li un consultant que refusa, sigui per raons personals, sigui perquè el jutja incapaç; no té el deure d'explicar a ningú les raons del seu refús.

El mateix ha d'aplicar-se en l'elecció d'un cirurgià o d'un especialista.

Pertoca al metge de capçalera avisar el o els consultants, deixant-los la designació del dia i de l'hora.

*Art. 33.*—En el cas d'una consulta entre metges, el de capçalera ha d'arribar primer i posar la família al corrent dels usos i de la qüestió dels honoraris.

És antiga i bona regla que la consulta, dirigida pel de més edat, compregui quatre temps:

- 1er. Una conferència preliminar.
- 2on. L'examen del malalt.
- 3er. Una conferència secreta.
- 4rt. La comunicació de la consulta a la família.

Si hi ha divergència d'opinions entre els met-

ges, el de capçalera pot: o bé acceptar la prescripció jutjada necessària pel metge o metges consultants o refusar acceptar-ne la responsabilitat, si la jutja inoportuna o perillosa; en el darrer cas, prevé el malalt o, preferentment, els seus familiars, de la divergència d'opinions, demanant un altra consulta.

Ha de retirar-se, si la família del malalt prefereix el consell del metge consultant i si ella refusa una nova consulta.

*Art. 34.*—El metge consultant no ha de reveure el malalt més que quan sigui cridat pel metge de capçalera. En cap cas, un metge pot convertir-se en el de capçalera dins una família, per la qual hagi estat cridat com consultant, sense la formal autorització del seu predecessor.

*Art. 35.*—Quan un malalt necessiti dels serveis d'un cirurgià, d'un especialista o d'un establiment mèdic, el metge de capçalera té el dret d'indicar les seves preferències; però, no havent-hi indignitat o col·laboració impossible, no ha d'assajar d'allunyar el seu client del cirurgià, l'especialista o l'establiment escollit pel malalt.

*Art. 36.*—Els cirurgians, els especialistes, els metges de banys als quals un malalt és adreçat directament per un metge, han d'enviar per escrit a aquest confrere el resultat del seu examen.

Acabada llur missió especial, no han de restar mai en relació d'ordre mèdic amb el malalt més que pels serveis de llur especialitat.

*Art. 37.*—Els cirurgians i els especialistes no han de fer pas cap operació seriosa sense avisar-ho al metge de la família, excepció feta del cas d'oposició del malalt a aquest avis.

*Art. 38.*—El consultori del metge és un terreny neutre on pot donar els seus consells a tots els qui n'hi demanin.

Resten prohibits:

1er. En el cas de medicina general, els malalts coneguts mitjançant una consulta i en el curs de la mateixa malaltia.

2on. En el cas de cirurgia o d'especialitat, els malalts coneguts per raó d'una consulta, una substitució o l'assistència a una operació, si fa menys d'un any, i si el confrere exerceix la mateixa especialitat. En els casos d'obstètrics, aquest lapsus de temps és reduït al de l'embaràs en curs i del període puerperal.