

## Opinions expressades per Doctors

Número 6)

Quan la part posterior del coll uterí estigui roja, desgastada i endurida, quan hi ha ulceracions acompanyades de sortida de líquid anormal acumulat espès i tenaç; en l'endometritis aguda i crònica: en les inflamacions dels ovaris, úter i vagina, l'ús abundant de la



produeix resultats immediats.

En el tractament de la part posterior del coll uterí i de la vagina empro un tap de llana de be cobert d'Antiphlogistine calenta. Aquest tap s'introdueix bé contra les parts afectades i es manté en el seu lloc amb glassa. Es deixa que la part de la glassa sobresurti, així com també el cordó que va adherit al tap, i a les pacients se les hi dóna les instruccions necessàries per tal que se'l treguin després d'haver transcorregut dotze o catorze hores de la seva aplicació.

R. A. V., M. D.  
St. Louis, MO.

---

**The Denver Chemical M.F.G. Company, New-York**

**LABORATORIS :**

**Londres, París, Berlín, Buenos Aires, Barcelona, Montreal, Mèxic,  
Sydney, Florència i Rio de Janeiro.**

*Agents exclusius de venda per a tota Espanya:*

**Dr. Andreu i Fills, carrer de Folgaroles, 17 :: Barcelona**