

Establecimientos Químico-Farmacéuticos Dr. RAVASINI & C^{ia} ROMA

NUCLEOGENINA

RAVASINI

SIMPLE:

(LECTINA-LUTEINA) de la yema del huevo en suspensión acuosa de suero fisiológico.
Ampollas de 1,2 y 5 cc.

ARSENICAL:

(Contiene, además de la LECITINA-LUTEINA, Anhídrido Arsenical).
Ampollas de 1,2 y 5 cc.

ARSENICAL con ESTRICNINA:

(Contiene, además de la LECITINA-LUTEINA, Anhídrido Arsenical y Estricnina).
Solamente en ampollas de 2 cc.

RECONSTITUYENTE PODEROSO.
muy indicado en las anemias primarias y secundarias, en las convalecencias, agotamiento orgánicos, tuberculosis inicial.

LOS ÚNICOS PRODUCTOS QUE HAN LOGRADO LA PERFECTA ASOCIACIÓN DE LA LECITINA CON EL ARSÉNICO Y LA ESTRICNINA.
Especialmente indicados en los casos de neurastenia, histerismo, agotamiento nervioso, priapostenia, impotencia sexual (CON ESTRICNINA), fatigabilidad, enfermedades del recambio, raquitismo.

"LACTEASI RAVASINI"

Suspensión de fermentos búlgaros puros, rigurosamente seleccionados, hecha sobre un terreno nutritivo especial y puesta en ampollas cerradas a la lámpara.

PRIMERO E INSUPERADO preparado de fermentos lácticos en cultura líquida.

Agente para España y Colonias: C.A. de SANTIS. Rambla Cataluña, 66. Teléfono 2985.G. BARCELONA.

INSTITUTO DE BIOLOGIA Y SUEROTERAPIA

I B Y S

BRAVO MURILLO, 45. - APARTAT 897. - TELEFON 34.824. - MADRID

V A C U N A B . C . G .

VACUNACIÓN ANTITUBERCULOSA EN LA PRIMERA INFANCIA PEL
MÉTODE DE B. CALMETTE I GUERIN

Essent de gran interès el poder obtenir estadístiques nombroses a Espanya, respecte a aquest nou mètode de vacunació, gratuïtament posem a la disposició dels senyors Metges-Tocòlegs, que ho sol·licitin, l'esmentada vacuna, així com també els fullets instructius per a la seva aplicació i les fitxes per a que cada cas sigui observat el temps necessari.

D'INTERÈS CIENTÍFIC