

<i>F Fox</i> (22). <i>Koplik.</i>	Una niña 6 años y medio.	
<i>Barbour</i> (23).	Un caso: niña de 18 años, comenzó la enfermedad á los 2 y medio.	Los primeros invadidos fueron las articulaciones grandes. Invasión simétrica. Su padre muy reumático. Nunca se afectó del corazón. Las articulaciones coxo femorales invadidas.
<i>Irvin.</i>	Un caso: á los 15 años, comenzó poco después del nacimiento.	El padre era sifilítico, la madre cataléptica. La invasión comenzó por los dedos gordos y tobillos, siguió por las muñecas y codos.
<i>Stoivell</i> (24).	Niña de 9 años: comenzó á los 6 años, á los 2 años y medio no podía ponerse en cama sino media sentada.	Los hombros y el codo dolorosos y anquilosados. Cabeza doblada sobre el torax, inmovil.

Sin precisar el número exacto de los casos registrados por bajo de 12 años, pues la colección de Bouchut es incierta, bien se advierte por la lista anterior que aun los clínicos de mayor número de enfermos no logran ver sino ejemplares aislados de la enfermedad. La edad más tierna en que se ha presentado es á los 18 meses (Sturges) y á los 2 años y medio (Moncorvo).

Revista de Sociedades

CONVIVENCIA

DEL

Colegio de Médicos y la Academia Médico-Farmacéutica de esta capital.

Escritura pública que han otorgado y firmado á nombre de dichas corporaciones y por delegación especial, los Presidentes y Secretarios de las mismas.

En la ciudad de Barcelona á veinticuatro de Marzo de mil ochocientos noventa y siete. Ante mí D. Carlos M. Soldevila y Boixader, abogado y notario del Ilustre Cole-

- (22) *The varieties of Rheumatoid arthritis*, Lancet, 1879, 2.º, 79.
 (23) *Archives of Pediatrics*. 1896, p. 849.
 (24) *Academia de Med. de New-York*. 8 Octubre 1896.