Per al tractament de la dispèpsia amilàcea.

TAKA-DIASTASA

P., D. & Co.

La Taka-Diastasa P., D. & Co. és un ferment que fa soluble 300 vegades el seu pes de midó en 10 minuts. Per consegüent, el seu poder amilolític és superior al de qualsevol altre medicament que s'usi per aquest objecte. Altrament, s'ha comprovat que la TAKA-DIASTASA ajuda la digestió de les proteïnes.

Preparacions:

Taka-Diastasa (en pols)
En flascons de 10, 25 i 100 grams.

Taka-Diastasa Liquida
En flascons de 100 grams.

TABLETES:
Taka-Diastasa, 0,16 grs.
Taka-Diastasa, Pepsina i Estricnina.
Taka-Diastasa, Pepsina i Pancreatina.
En flascons de 25 i 100.

Parke, Davis & Co.
Londres

INDICACIONS:

Dispèpsia amilàcea, produint un alivi immediat dels símptomes que l'acompanyen: Flatulència, mareig, cefalàlgia i hiperacidesa. Es útil també en les gastritis, gastroenteritis i en les diarrees infantils acompanyades de flatulència, etc.

Ampolles Neurotòniques SAMORA

DE SULFAT D'ESTRICNINA A DOSIS CREIXENT

Sèrie 1.ª: De 1 a 6 ½ mil ligrams per c. c.
» 2.ª: » 7 » 12 » » » » »

PROGRESSIÓ CONSTANT
De ½ MIL LIGRAM PER DOSI

MOSTRES I LITERATURA: **LABORATORI SAMORA - Floridablanca, 119 - BARCELONA**

ELECTROLACTIL

FERMENTOS LÁCTICOS
EN LIQVIDO Y COMPRIMIDOS

INDICACIONES

GASTRO-ENTERITIS
DIARREAS. FIEBRE TIFOIDEA
AVTO-INTOXICACIONES DE ORIGEN
INTESTINAL. GRIPE.

ELECTROLACTIL

LABORATORIO
ASENSI, XERDI Y Cª