

ren en ells els èxits més sorprenents. Tot cirurgià expert coneix el trist quadre que ofereixen aquests malalts. Són característics per la seva decadència ràpida, temperatures sèptiques, albuminúria i abundant sortida de pus. El destí d'aquests infelços ja està segellat. Moren tots en poques setmanes o mesos a causa de la debilitat, que va en augment, infecció o, també, a causa de l'aparició del ronyó amiloidei. Tampoc tenim coneixement de cap mitjà que pugui influir aquest curs o d'impedir-lo. Molts d'aquests malalts predestinats a

Fins després d'un guariment clínic es poden encara sentir freqüentment sorolls (Real, Alexander). S'ha d'anar molt en compte en fer ús dels raigs X. Tant el focus actiu, com la cicatriu, mostren una taca com una ombra, la qual no pot ésser de cap manera ben apreciat, i menys encara si les condicions de la fotografia (duresa i distància del tub) no han estat iguals.

Dels nostres 184 tuberculosos, 116 o sigui les dues tercers parts, patien dels pulmons. En diferents inspeccions fetes en el laboratori d'exàmens

Resultat de la tuberculosi dels ossos	Núm. total	Temps d'observació	Aptes pel treball	Millora considerable	Millorats encara necessitats de tractament	No millorats	Morts
Tuberculosi dels ossos amb complicacion (pulmons, ronyons, pe'l, glàndules)	9	2	2	2	2	1	—
Tuberculosi dels ossos amb fistules . . . . .	10	4	2	3	—	1	—
Tuberculosi d'ossos sense fistules . . . . .	4	—	1	—	2	1	—
Caxitis amb fistules . . . . .	2	—	—	1	1	—	—
Coxitis sense fistules . . . . .	3	—	2	1	—	—	—
Espondilitis amb . . . . .	5	—	—	2	1	1	1
Espondilitis sense fistules . . . . .	4	2	1	1	—	—	—
	37	8	8	10	6	4	1

morir, han estat salvats pel tractament d'alimentació.

També la tuberculosi dels ossos es resseca i cicatritza per mitjà de l'alimentació. Regularment, les fistules petites i mitjanes es tanquen. Naturalment que es retarda si existeix un seqüestre.

Més difícil que en la tuberculosi exterior, és el demostrar l'èxit local en la tuberculosi dels pulmons. Almenys es deixa veure pels ulls més difícilment. Els resultats d'una inspecció mediata poden enganyar.

El dictamen segons els resultats de l'auscultació es fa més difícil a causa dels petits cruiximents que es produeixen en encongir-se el teixit.

de Munic, resultà que tots els afectats treien bacils en escopir. La major part d'ells ja ens varen ésser assenyalats com a malalts dels pulmons. El metge que els visitava, el senyor conseller de sanitat Dr. Baer, observà contínuament els malalts i comprovà el resultat del guariment. Una part dels malalts dels pulmons varen ésser conduïts de la clínica de cirurgia al pavelló -Y, per tal de sotmetre'ls al tractament d'alimentació, abans o després d'haver pres determinis operatius.

A la major part (113) se'ls havien format fusions si cavernes durant el transcurs de llur tuberculosi exsudativa i fibroso-exsudativa.