

eis quals havien estat en estret contacte amb el lloro.

Tan sols fou respectada la filla mitjana de 17 anys, amb tot i que com els altres, també s'havia entretingut alguna vegada amb el papagai. També caigué malalta la coneguda del geòleg, la qual vivia sola a casa seva. D'entre la família que rebé el lloro (R) no malalt, no es registraren malalties que tinguessin relació amb aquella dolença.

L'aspecte de la malaltia en tots els malalts coincidí en el fons, però variava en la gravetat del transcurs i corresponia exactament al quadro de l'esmentada dolença dels papagais, això és, consistia en una malaltia general febrosa, amb greus atacs cerebrals, descens de pressió sanguínia en alt grau, afegint-s'hi després una pulmonia atípica i sense esputs. Respecte particularitats clíniques que ja han estat exposades en altres llocs, no en farem esment. El geòleg i la modista moriren; la muller, la coneguda i l'estudiant, principalment els dos primers, guariren després d'haver estat en greu perill llurs vides i d'un llarg transcurs de la malaltia. Les filles i la minyona emmalaltiren de menys gravetat.

Poc temps després ens notificaren un altre cas: un matrimoni que vivia sol, compraren cap a les acaballes del novembre un papagai, i al cap de vuit o deu dies, d'haver-lo adquirit, tant l'home com la dona emmalaltiren amb altes temperatures, declarant-se'ls, ensems, una pulmonia atípica, per la qual cosa foren traslladats a l'hospital. Aleshores uns veïns del mateix pis, que no eren altres que el germà del malalt, la seva dona, el seu fill i la muller d'aquest es possessionaren del papagai, i també al cap de vuit o deu dies, caigueren malalts el germà i la seva dona amb els símptomes típics, pel que es veieren obligats de portar-los a l'hospital. Els dos germans moriren, les dones es salvaren després d'un transcurs de la malaltia de mitjana gravetat. La filla política, enterada pels diaris de l'existència de la dolença dels papagais, va dur el lloro..., encara que aparentment estigués bo—val a dir que no havia estat observat amb detenció—a l'escola superior de veterinaris. El seu home (el fill del segon germà) després d'uns quants dies de malestar i tenint unes dècimes, es veié obligat a ficar-se al llit, deu dies després d'haver-se'n endut el papa-

gai. Tant ell com la seva dona, la qual se sentia abatuda i tenia una lleugera faringitis, foren traslladats a l'hospital per tal de poder-los observar i tractar millor. Actualment, l'home té altes temperatures, i comencen a aparèixer els primers símptomes d'una pulmonia.

A més d'aquests casos ens han estat notificats d'altres focus de malaltia, en els quals la coexistència de l'epidèmia i l'aspecte clínic coincideixen amb els ja esmentats. Per tant, es pot prescindir d'una explicació detallada.

En els malalts dels dos focus anteriorment descrits, com també en malalts d'altres focus, es feren recollir, ensems que inspeccionar, frotis de la gola, lesions de la llengua, ombres en plaques de Petri de les partícules expedides per la tos, esput (només existent en un cas), sang, dejeccions, orina, així com també s'empraren els més diversos medis de cultiu, mètodes d'enriquiment, cultiu aerobis i anaerobis dintre una atmosfera rica en CO₂. Amb igual minuciositat s'emprerent també investigacions serològiques. Aquestes s'estenien al grup del tifus-paratifus, junt amb els bacils de Nocard i els X-19, com també als gèrmens recollits i sembrats en els homes i bèsties malalts. Junt amb aquestes investigacions en el viu, també es portaren a cap treballs d'autòpsia en tres morts de la mateixa malaltia, en els quals es tingué en compte a més de la sang i de tots els òrgans interiors, el contingut dels intestins, bufeta, glàndules, medulla dels ossos i musculatura. Les investigacions s'orientaren principalment en direcció dels agents provocadors, fins ara coneguts, com també en recerca d'algun virus encara ignorat.

De tots aquests materials se'n pogueren cultivar moltes bacteries, però, amb tot, no es podia demostrar que cap d'elles tingués una importància causal. També les investigacions histològiques que emprengueren els senyors Walkhoff i Busch en els òrgans dels morts, segons notificaren ells mateixos, tampoc donaren cap resultat específic.

No es pogueren obtenir papagais malalts de focus epidèmic en estat aprofitable. L'un, l'animal del geòleg, ja estava completament podrit; dels seus òrgans només naixien bacils proteus. L'altre (R) que poguérem obtenir, com també l'animal del segon focus, exteriorment no estava malalt, i no donava senyals de canvis orgànics ma-