

BOROSAL

Sol. acuosa de tartrat bórico sódic al 50%

EPILEPSIA

INCONTINENCIA NOCTURNA D'ORINA DELS NENS Y ADOLESCENTS

Medicació introduïda recentment a la pràctica pels doctors Marie. / Crouzon i Boutlier /

■ ■ ■

EL BOROSAL substitueix amb gran avantatge la medicació bromurada. Efectes molt superiors; cap dels seus inconvenients (ni trastorns gàstrics, ni acnés medicamentosos), ni entorpi-
/// ment cerebral. ///
El BOROSAL no és una medicació paliativa. El BOROSAL modificant el metabolisme nutritiu de les cèl·lules nervioses obra sobre la causa i arriba a curar radicalment la

Epilepsia essencial, alleujant sempre la **simptomàtica** de qualsevol origen, EL BOROSAL és, en el seu gènere el primer i més caracteritzat dels específics nacionals i, per no tenir en absolut *bromurs* en cap classe de *narcòtics*, no té parió entre els existents. EL BOROSAL és tan eficaç i ràpid com inofensiu i sempre ben tolerat, àdhuc pels nens

ELS ATACS EPILEPTICS, i des de les primeres setmanes d'ésser medicats amb el Borosal, disminueixen progressivament en número i intensitat en forma realment meravellosa. Cal només persistir per a obtenir la desaparició completa dels esmentats atacs.

LA INCONTINENCIA NOCTURNA D'ORINA desapareix sense /
que calgui d'insistir gaire amb la medicació /


Propaganda exclusivament mèdica

DOSIS: 1 a 3 culleradetes de café, dues vegades al dia, després de menjar, amb aigua ensucrada, segons les instruccions del prospecte i el pare del metge.

Registat a la Inspecció General de Sanitat amb el número 3,617 el 31 d'octubre de 1923

DIPOSITS:

BARCELONA: Dr. Andreu, Pèrez Martín, Dalmau Oliveras, Viladot i N. Gelart, Princesa, 7. — Girona: J. Pérez Xifra, Abeuradors, 2. — Lleida: J. Morell Sanuy, Sant Antoni, 13. — Tarragona: R. Sanromà, Unió, 17.



Indicadíssim

en la

NEURASTENIA,

HISTERISME,

NEURALGIES,

COREA,

TCS,

DELIRIS,

ESPASMES,

INSOMNIS,

NOIS IRRITABLES

i en general tots els casos de

ERETISME NERVIOS

■ ■ ■