

FAGIFOR

CITO



COMPOSICIÓ:

Calc aceticum . . . 0'14 gs.	Ferrum aceticum. . . 0'02 gs.
Calc. benzoicum. 0'02 »	Kreosol guaiacol fluid 0'02 »
Calc. lacticum . . 0'02 »	Menthol puris. 0'002 »
Calc. salicylicum 0'02 »	Syrup aromàtic. 20'60 »

D O S I S : { ADULTS: Una copeta de les de licor } Després dels tres àpats.
 { NENS: Mitja id. id. id. }

INDICACIONS:

En les bronquitis, grip, neumònia, catarros pulmonars i les tuberculos pulmonar, òsia i laringia. Expectorant de primer ordre.

PODERÓS RECALCIFICANT

L'originalitat del FAGIFOR és posseir íntegrament l'acció de la *creosota*, havent-se corregit en absolut tots els seus inconvenients (sabor, acció damunt l'estómac, etc.).

El FAGIFOR no conté cap substància tòxica, calmant o anestesiant, per la qual cosa pot administrar-se als nens sense cap mena d'inconvenient per tot el temps que precisi emprar-lo.



SALVACID

Nova medicació racional i etiològica per a les malalties de l'estómac
 Suprimeix ràpidament tots els símptomes subjectius (pirosis, gastràlgies, etc., etc.) i restableix la normalitat fisiològica i permet la guarició espontània de la malaltia.

INDICACIONS: Úlcera gàstrica i duodenal. — Hiperclorhídria. — Gastritis

COMPOSICIÓ

Bilis dessecada	0 10 gr.
Acid acetilglicòdic	} aa 0.05 »
Tiuyoncolilglicina	
(Tetraacetilglicocoliltuyilamina)	
Bicarbonat de	} aa 0.05 »
Carbonat de calci	
Glicirricina c. s. per a 1 comprimit	

Demaneu mostres i literatura a

PERE BENEJAM

Avinguda Portal de l'Angel, 6

= = =

BARCELONA