


# FAGIFOR

"CITO"



## COMPOSICIÓ:

Calc aceticum . . . 0'14 gs.	Ferrum aceticum . . . 0'02 gs.
Calc. benzoicum . 0'02 »	Kreosol guaiacol fluid 0'02 »
Calc. lacticum . . 0'02 »	Menthol puris. . . . . 0'002 »
Calc. salicylicum 0'02 »	Syrup aromàtic. . . . 20'00 »

DOSIS: { ADULTS: Una copeta de les de licor } Després dels tres àpats.  
NENS: Mitja id. id. id.

## INDICACIONS:

En les bronquitis, grip, neumònica, catarros pulmonars i les tuberculosis pulmonar, òsia i laringia. Expectorant de primer ordre.

### PODERÓS RECALCIFICANT

L'originalitat del FAGIFOR és posseir íntegrament l'acció de la creosota, havent-se corregit en absolut tots els seus inconvenients (sabor, acció damunt l'estòmac, etc.).

El FAGIFOR no conté cap substància tòxica, calmant o anestesiant, per la qual cosa pot administrar-se als nens sense cap mena d'inconvenient per tot el temps que precisi emprar-lo.



# SALVACID

## Nova medicació racional i eliològica per a les malalties de l'estòmac

Suprimeix ràpidament tots els símptomes subjectius (pirosis, gastràlgies, etc., etc.) i restableix la normalitat fisiològica i permet la guarició espontània de la malaltia.

INDICACIONS: Úlcera gàstrica i duodenal. — Hiperclorhidria. — Gastritis

## COMPOSICIÓ

Bilis dessecada . . . . .	0.10 gr.
Acid acetilglicocòlic . . . . .	0.05 >
Thuyoncoliglicina . . . . .	aa . . . . .
(Tetraacetilglicocoliltuyilamina)	
Bicarbonat de sosa . . . . .	0.05 >
Carbonat de calci . . . . .	aa . . . . .
Glicirricina c. s. per a 1 comprimit	

Demaneu mostres i literatura a

PERE BENEJAM

Avinguda Portal de l'Angel, 6

= = =

BARCELONA