


# FAGIFOR

## CITO



### COMPOSICIÓ:

Calc aceticum . . . 0'14 gs.	Ferrum aceticum. . . 0'02 gs.
Calc. benzoicum. 0'02 »	Kreosol guaiacol fluid 0'02 »
Calc. lacticum . . 0'02 »	Menthol puris. . . . . 0'002 »
Calc. salicylicum 0'02 »	Syrup aromàtic. . . . 20'00 »

**D O S I S :** { ADULTS: Una copeta de les de licor } Després dels tres àpats.  
 { NENS: Mitja id. id. id. }

### INDICACIONS:

En les bronquitis, grip, neumònia, catarros pulmonars i les tuberculosi pulmonar, òsia i laringia.  
 Expectorant de primer ordre.

### PODERÓS RECALCIFICANT

L'originalitat del FAGIFOR és posseir íntegrament l'acció de la creosota, havent-se corregit en absolut tots els seus inconvenients (sabor, acció damunt l'estómac, etc.).

El FAGIFOR no conté cap substància tòxica, calmant o anestesiant, per la qual cosa pot administrar-se als nens sense cap mena d'inconvenient per tot el temps que precisi emprar-lo.



# SALVACID

### Nova medicació racional i etiològica per a les malalties de l'estómac

Suprimeix ràpidament tots els símptomes subjectius (pirosis, gastràlgies, etc., etc.) i restableix la normalitat fisiològica i permet la guarició espontània de la malaltia.

**INDICACIONS:** Úlcera gàstrica i duodenal. — Hiperclorhidria. — Gastritis

### COMPOSICIÓ

Bilis dessecada . . . . .	0.10 gr
Acid acetilglicocòlic . . . . .	} aa . . . . . 0.05 .
T. uyoncolilglicina . . . . .	
(Tetraacetilglicocoliltuyilamina)	
Bicarbonat de sosa . . . . .	} aa . . . . . 0.05 .
Carbonat de calci . . . . .	
Glicirricina c. s. per a 1 comprimit	

Demaneu mostres i literatura a

**PERE BENEJAM**

Avinguda Portal de l'Angel, 6

= = =

**BARCELONA**