

# BOROSAL

Sol. acuosa de tartrat bórico sódic al 50%

## EPILEPSIA

## INCONTINENCIA NOCTURNA D'ORINA DELS NENS Y ADOLESCENTS

El BOROSAL substitueix amb gran avantatge la medicació bromurada. Efectes molt superiors: cap dels seus inconvenients (ni trastorns gàstrics, ni accés medicamentosos), ni entorpidiment cerebral. El BOROSAL no és una medicació paliativa. El BOROSAL modificant el metabolisme nutritiu de les cèl·lules nervioses obra sobre la causa i arriba a guarir radicalment l'Epilepsia essencial alleujant sempre la simptomàtica de qualsevol origen. El BOROSAL és, en el seu gènere



ere el primer i més caracteritzat dels específics nacionals i per no tenir en absolut bromurs en cap classe de narcòtics, no té parió entre els existents. El BOROSAL és tan eficaç i ràpid com inofensiu i sempre ben tolerat, àdhuc pels nens.

NEURASTENIA, HISTERISME, NEURALGIES, COREA, ESPASMES, INSOMNIS, NOIS IRRITABLES i en general tots els casos de ERETISME NERVIOS

### DOSIS

D'1 a 3 culleradetes de cafè, dues vegades al dia, després de menjar, amb aigua cancrada, segons les instruccions del prospecte i el parer del metge. Registrat a la Inspecció General de Sanitat amb el número 3,617 el 31 d'octubre del 1923.

## Nou mètode citofilàctic MAGNESTYL GELART Profilaxi del Cranc

MAGNESTYL fa desaparèixer lesions precanceroses  
Sense lesions precanceroses no hi ha cranc

### INDICACIONS DE MAGNESTYL:

Lesions precanceroses - Papil·lomes - Psoriasis - Berruges - Tumors - Furúnculs - Antràx - Dermatitis - Plurits - Ulceres - Eczemes - Infeccions de les vies biliars - Autointoxicacions intestinals

Us intern: Dues culleradetes (10 c. c.) pel matí en dejú

Us extern: Quatre culleradetes (20 c. c.) en 250 c. c. d'aigua

MOSTRES I LITERATURA:

LABORATORIS GELART: Menéndez-Pelayo, 53 : BARCELONA

PROPAGANDA EXCLUSIVAMENT MEDICA