

FAGIFOR

w CITO w

COMPOSICIÓ:

<i>Calc aceticum</i>	0'14 gs.	<i>Ferrum aceticum</i>	0'02 gs.
<i>Calc. benzoicum</i>	0'02 »	<i>Kreosol guaiacol fluid</i>	0'02 »
<i>Calc. lacticum</i>	0'02 »	<i>Menthol puris</i>	0'002 »
<i>Calc. salicylicum</i>	0'02 »	<i>Syrup aromàtic</i>	20'00 »

DOSIS: { ADULTS: Una copeta de les de licor { Després dels tres àpats.
NENS: Mitja id. id. id.

INDICACIONS:

En les bronquitis, grip, neumònia, catarros pulmonars i les tuberculosis pulmонаr, òsia i laringia. Expectorant de primer ordre.

PODERÓS RECALCIFICANT

L'originalitat del FAGIFOR és posseir íntegrament l'acció de la creosota, havent-se corregit en absolut tots els seus inconvenients (sabor, acció damunt l'estòmac, etc.).

El FAGIFOR no conté cap substància tòxica, calmant o anestesiant, per la qual cosa pot administrar-se als nens sense cap mena d'inconvenient per tot el temps que precisi emprar-lo.



SALVACID

Nova medicació racional i etiològica per a les malalties de l'estòmac

Suprimeix ràpidament tots els símptomes subjectius (pirosis, gastràlgies, etc., etc.) i restableix la normalitat fisiològica i permet la guarició espontània de la malaltia.

INDICACIONS: Úlcera gàstrica i duodenal. — Hiperclorhidria. — Gastritis

COMPOSICIÓ

Bilis dessecada	0.10 gr.
Acid acetilglicocòlic . . .	0.05
Tuyoncoliglicina	0.05
(Tetraacetilglicocoliltuyamina)	
Eicarbonat de soda	0.05
Carbonat de calci	
Glicirricina c. s. per a 1 comprimit	

Demaneu mostres i literatura a

PERE BENEJAM

Avinguda Portal de l'Angel, 6

= = =

BARCELONA