

FAGIFOR

• CITO •

COMPOSICIÓ:

| | |
|-------------------------------------|---------------------------------------|
| <i>Calc aceticum . . . 0'14 gs.</i> | <i>Ferrum aceticum . . . 0'02 gs.</i> |
| <i>Calc. benzoicum . 0'02 »</i> | <i>Kreosol guaiacol fluid 0'02 »</i> |
| <i>Calc. lacticum . . 0'02 »</i> | <i>Menthol puris. 0'002 »</i> |
| <i>Calc. salicylicum 0'02 »</i> | <i>Syrup aromàtic. . . . 20'00 »</i> |

DOSIS: { ADULTS: Una copeta de les de licor } Després dels tres àpats.
NENS: Mitja id. id. id.

INDICACIONS:

En les bronquitis, grip, neumònia, catarros pulmonars i les tuberculosis pulmonar, òsia i laringia. Expectorant de primer ordre.

"PODERÓS RECALCIFICANT

L'originalitat del FAGIFOR és posseir íntegrament l'acció de la creosota, havent-se corregit en absolut tots els seus inconvenients (sabor, acció damunt l'estòmac, etc.).

El FAGIFOR no conté cap substància tòxica, calmant o anestesiant, per la qual cosa pot administrar-se als nens sense cap mena d'inconvenient per tot el temps que precisi emprar-lo.



SALVACID

Nova medicació racional i efisiològica per a les malalties de l'estòmac

Suprimeix ràpidament tots els símptomes subjectius (pirosis, gastràlgies, etc., etc.) i restableix la normalitat fisiològica i permet la guarició espontània de la malaltia.

INDICACIONS: Úlcera gàstrica i duodenal. — Hiperclorhidria. — Gastritis

| | | |
|------------|-----------------------------------|--------------|
| COMPOSICIÓ | Bilis dessecada | 0.10 gr. |
| | Acid acetilglicòlic | 0.05 » |
| | Tetraacetilglicina | aa |
| | (Tetraacetilglicocollituyilamina) | |
| | Bicarbonat de sosa | aa |
| | Carbonat de calci | 0.05 » |

Glicirricina c. s. per a 1 comprimit

Demaneu mostres i literatura a

PERE BENEJAM

Avinguda Portal de l'Angel, 6

= = =

BARCELONA