

BOROSAL

Sol. acuosa de tartrat bórico sódic al 50%

EPILEPSIA

INCONTINENCIA NOCTURNA D'ORINA DELS NENS Y ADOLESCENTS

El BOROSAL substitueix amb gran avantatge la medicació bromurada. Efectes molt superiors; cap dels seus inconvenients (ni trastorns gàstrics, ni acnés medicamentosos), ni entorpidiment cerebral. El BOROSAL no és una medicació pal·liativa. El BOROSAL modificant el metabolisme nutritiu de les cèl·lules nervioses obra sobre la causa i arriba a guarir radicalment l'epilèpsia essencial alleujant sempre la simptomàtica de qualsevol origen. El BOROSAL és, en el seu gènere



ere el primer i més caracteritzat dels específics nacionals i per no tenir en absolut bromurs en cap classe de narcòtics, no té parió entre els existents. El BOROSAL és tan eficaç i ràpid com inofensiu i sempre ben tolerat, àdhuc pels nens.

NEURASTENIA, HISTERISME, NEURALGIES, COREA, ESPASMES, INSOMNIS, NOIS IRRITABLES i en general tots els casos de ERETISME NERVIOS

DOSIS

D'1 a 3 culleradetes de café, dues vegades al dia, després de menjar, amb aigua ensucrada, segons les instruccions del prospecte i el parer del metge. Registrat a la Inspecció General de Sanitat amb el número 3.617 el 31 d'octubre del 1923.

Nou mètode citofilàctic MAGNESTYL GELART Profílaxi del Cranc

MAGNESTYL fa desaparèixer lesions precanceroses
Sense lesions precanceroses no hi ha cranc

INDICACIONS DE MAGNESTYL:

Lesions precanceroses - Papil·lomes - Psoriasis - Berruges - Tumors - Furúnculs - Antrax - Dermatitis - Prurits - Ulceres - Eczemes - Infeccions de les vies biliars - Autointoxicacions intestinals

Us intern: Dues culleradetes (10 c. c.) pel matí en dejú

Us extern: Quatre culleradetes (20 c. c.) en 250 c. c. d'aigua

MOSTRES I LITERATURA:!

LABORATORIS GELART: Menéndez-Pelayo, 53 : BARCELONA

PROPAGANDA EXCLUSIVAMENT MEDICA