

Establecimientos Químico - Farmacéuticos Dr. R. RAVASINI & C^a ROMA

NUCLEOGENINA

« RAVASINI »

LECITINA-LUTEINA) de la yema del huevo en suspensión aséptica de suero fisiológico.

Ampollas de 1, 2 y 5 c.c.

RECONSTITUYENTE PODEROSO muy indicado en las anemias primarias y secundarias, en las convalecencias, agotamientos orgánicos, tuberculosis inicial.

Contiene, además de la LECITINA LUTEINA, Anhidrido Arsenical.

Ampollas de 1, 2 y 5 c.c.

LOS ÚNICOS PRODUCTOS QUE HAN LOGRADO LA PERFECTA ASOCIACIÓN DE LA LECITINA CON EL ARSÉNICO Y LA ESTRICNINA. Especialmente indicados en los casos de neurastenia, histerismo, agotamiento nervioso, psicoastenia, impotencia sexual (con ESTRICNINA) fosfurias, enfermedades del recambio, raquitismo.

Contiene, además de la LECITINA LUTEINA, Anhidrido Arsenical y Estricnina.

Solamente en ampollas de 2 c.c.

Agente para España y Colonias: C.A de SANTIS. Calle Mallorca 244. Tel. 75114. BARCELONA

FLUOTHYMINA

A BASE DE FLUOROFORM PUR ABSOLUTAMENT INOCU
INDICACIONS

TOS FERINA, TOS ESPASMODICA
TOS DELS TUBERCULOSOS

MOSTRES I LITERATURA DR. TAVA I BOFILL PLACA SANT ABESTI VELL 13-BARCEL

KALOGEN

A BASE DE CLORUR, BROMUR I IODUR DE CALCI PUR
S'obté per un procediment especial que assegura una perfecta estabilitat i una ràpida assimilació de la Sal calcaica
INDICACIONS

Raquitisme en les seves diferents manifestacions i a tots els casos que convingut una acció recalificanti ràpida i enérgica

LABORATORI - DOCTOR GUERRA CORTES
SALMERON 166 BARCELONA

INGAN
PARA FETES
TARIBES
LA INADE-
TENCIA DE
LOS NINOS
DE CAL (FI-
CACION RA-
QUITISMO)
DE TUBER-
CULOSIS
DE GUERRA

INGAN
CONTRA L'ANOREXIA
DELS INFANTS