

Per al tractament de la dispèpsia amilàcea.

TAKA-DIASTASA

P., D. & Co.

La Taka-Diastasa P., D. & Co. és un ferment que fa soluble 300 vegades el seu pes de midò en 10 minuts. Per consegüent, el seu poder amilolític és superior al de qualsevol altre medicament que s'usi per aquest objecte. Altrament, s'ha comprovat que la TAKA-DIASTASA ajuda la digestió de les proteïnes.

Preparacions:

Taka-Diastasa (en pols)
En flascons de 10, 25 i 100 grams.

Taka-Diastasa Líquida
En flascons de 100 grams.

TABLETES:

Taka-Diastasa, 0,16 grs.
Taka-Diastasa, Pepsina i Estricnina.
Taka-Diastasa, Pepsina i Pancreatina.
En flascons de 25 i 100.

Parke, Davis & Co.

Londres

INDICACIONS:

Dispèpsia amilàcea, produint un alivi immediat dels símptomes que l'acompanyen: Flatulència, mareig, cefalàgia i hiperacidesa. Es útil també en les gastritis, gastroenteritis i en les diarrees infantils acompanyades de flatulència, etc.



FIMOCAL SOLDUGA

Medicació tònic-antisèptica, calmant i resolutiva de les afeccions de

I' APARELL RESPIRATORI

COMPOSICIO

Arrhenal	:	0'05	grams
Codeina	:	0'05	>
Tiocol Roche	:	4'00	>
Lactofosfat de calç	{ aa	2'00	>
Benzoat de sosa	{ aa	XV	gotes
Alcoholat acònít	:	X	>
belladona	:		
xarop de Tolú	{ aa.	50'00	grams
Savia de Pi			

TESTOGAN

"HENNING" - masculi

Neurastènia sexual, impotència, vellesa prematura i tots els estats d'esgotament

Mostres i literatura:

WALTER ROSENSTEIN, SUC.
Barcelona-Apartat 712

SIL-AL

META HIDROSILICAT D'ALUMINI
FISIOLOGICAMENTE PUR

SUBSTITUEX EL BISMUT EN TERAPEUTICA
GASTRICA. - EXISTEIX EL SIL-AL BELLADONAT

$AL_2(Si-O_3)_3$

PREPARAT EN ELS LABORATORIS

A. GAMIR - Pare Jofré, 9 - VALENCIA

Representant M. RIPOLL - Plaça Letamendi, 34 - Tel. 11946 - Barcelona