

# REUMATISMES DIATÈSICS I TÒXICS (AGUTS I CRÒNICS)

No n'hi ha prou, en el tractament del Reumatisme, amb la desintegració i eliminació de les acumulacions uràtiques, i menys encara amb la mitigació del dolor; és indispensable per a guarir, modificar essencialment el metabolisme reumàtic.

# DIATURASA (INJECTABLE, CAPSULINES, GRANULAT I BALSAM)

## INJECTABLE

Eter salicil-benzo-bencílic, 0'20; Sotfe orgànic, 0'05; Eter benicil-morruc, 0'50; Oli neutre etericamforat, a l'1 %  
Q. S. per una ampolla de 5 cc.

## GRANULAT

Eter fenilcincònic-metilic, 0'30; Sulfoal·lòiat de formina, 0'30; Nuclatínofosfat lílic, 0'25; Metilarsinat sòdic, 0'25; Sala aforvecents, edulcorant i aromàtics, Q. S. per una dosi de 5 gr. (culleradeta plena)

## CAPSULINES

Eter salicil-benzo-bencílic, 0'10; Eter benicil-morruc, 0'095; Sotfe orgànic, 0'005, per capsulina de 0,20 gr.

## BÀLSAM

Eter salicil-benzo-bencílic, 25; Hidrat de terpien, 10; Càntora, 5; Mentol, 2; Essència aromàtiques, 2; Oli d'Hyoscyamus niger compost, Q. S. per un total de 100 grams de producte.

HEUS ACÍ UN PAS GEGANTÍ DE MÀXIMA EFICÈNCIA EN LA TERAPÈUTICA CURATIVA DE LA URICÈMIA

Prescribeixi's l'**injectable** (intramuscular) 2, 3 dies per setmana, o bé diàriament, segons la intensitat del cas, i conjuntament indiqui's l'ús del **granulat** i aleshores haurà fet el metge una veritable tasca guaritiva del Reumatisme. Reservi's les **capsulines** per a substituir l'injectable en els períodes de descans i en aquells casos en què la intransigència del pacient el refusi; i el **bàlsam** (extern) com el calmant del dolor de més positiva eficàcia.

Reumatisme, Gota, Obesitat, Litiasis, Dermatitis diatèsiques, Arterioesclerosi, Artrisme amb totes llurs conseqüències, i en general tot trastorn provocat i sostingut per una intoxicació uràtica, són les indicacions de la nostra  
DIATURASA

DEMANI'S LITERATURA I MOSTRES PER EXPERIMENTACIÓ

LABORATORIS CERA, S. A.

VICO, 18, I COPÈRNIC, 35 AL 39  
BARCELONA