

# FARMACOLOGIA

DE L

# UROTOFAN



A BASE DE  
FENILCINCONINAT DE LITINA

En l'**UROTOFAN** es troba associat el fenilcinconinat de litina (*atofanat de litina*) al grup dels components de l'**Urodonal** (*metilglioalidina de quinat de dietilenodiamina més Hexametilenotetramina*).

S'ha escollit el fenilcinconinat de litina per ésser més assimilable i menys molest a l'estómac que els salicilats i l'àcid fenilcínconic aïllat.

L'**Urotofan** s'absorbeix ràpidament per les vies digestives sense provocar cap mena d'irritació ni de trastorn.

L'**Urotofan** posseeix una acció electiva específica sobre l'àcid úric amb el qual es combina formant cossos molt solubles i fàcilment eliminables pel ronyó.

Per la seva acció oxidant i activadora del metabolisme, l'**UROTOFAN** es el medicament etiologic i natural de les malalties de la nutrició compreses en el grup de l'**ARTRITISME: Neuràlgies, Ciàtica, Migranya, Obesitat, Ezcemes, Dermatosis amb tendència congestiva, i Reumatisme agut i crònic muscular i visceral.**

## COMPOSICIO

Fenilcinconinat de litina 1 gr. 10  
Hexametilenotetramina 5 gr. 20  
Fosfat disòdic . . . . . 9 gr. 80  
Citrat de Sosa . . . . . 6 gr. 50  
Excipient efer. q. s. p. 100 gr.

MOSTRES I LITERATURA EN EL DIPÒSIT GENERAL  
APARTAT. 718 - Barcelona - Espanya