

SACER - SAN "CELSUS"

TABLETES ELIXIR

Combinació a dosis adequades i atòxiques de Bromur sòdic, Lumina i Calci

*De positius resultats
en el tractament de:*

Epilèpsia

Eclàmpsia

Corea

Paràlisi agitant

Mal de cap

Neurastènia

Histerisme

Insomni nerviós

Manies agudes

MILLORA ELS CASOS MES REBELS

(Propaganda exclusivament mèdica)

KATGUT KALMERID

Catgut incomparablement superior al CATGUT IODAT

El CATGUT KALMERID (bullible i no bullible) es deu vegades més germicida que el *Catgut iodat*, té un coeficient de tensió un 16% superior al del *Catgut iodat*, no és tòxic ni irritant per els teixits, no s'altera per la acció del temps ni de la llum, és reabsorbit amb regularitat.

CATGUT KALMERID ràpidament absorbible i de 10, 20 ó 40 dies de període de reabsorció.

AGULLES ATRAUMATIQUES per a *sutures gastro-intestinals*. Porten Catgut Kalmerid bullible de 20 dies.

Tubs d'una agulla recta, dues agulles rectes, una agulla corba de $\frac{3}{8}$, ó de $\frac{1}{2}$ circumferència.

TENDONS DE CANGUR, SEDES i tota mena de *sutures quirúrgiques*.

DAVIS & GECK, NC.

211 a 221, Duffield Street - Brooklyn

N. Y., U. S. A.

Dr. FRANCESC PUIG SUREDA

Passeig de Sant Joan, 53 - BARCELONA

SANOCRY SIN

ORIGINAL

MOLLGAARD

Per a la quimioteràpia de la tuberculosi segons el mètode de Mollgaard.

En dosis de: 0,01-0, 025-0, 05-0, 10-0, 15
0,25-0, 50-0,75 i 1 gram.

Mostres i literatura extensa a la disposició de tots els senyors Metges que ho sol·licitin.

CONCESSIONARIS PER A ESPANYA

COMERCIAL IBERO DANESA, S. A.

S.^a de Valentí Aage Moller

Via Layetana, 20

BARCELONA